

**Datos del Producto**

**Número de Registro:** 11826    **Estado:**  Vigente    **Fechas**    **Inscripción:** 12/07/1976    **Renovación:** 08/11/2016    **Caducidad:** 15/03/2025  
**Nombre Comercial:** APHOX

**Titular**

**ADAMA Agriculture España S.A.**  
 C/ Príncipe de Vergara 110, 5ª Planta.  
 28002 Madrid  
 (Madrid)  
 ESPAÑA

**Fabricante**

**ADAMA CELSIUS B.V. CURAÇAO BRANCH**  
 Pos Cabai Office Park, Unit 13 - P.O. Box 403  
 CURAAO  
 ANTILLAS HOLANDESAS

**Composición**

PIRIMICARB 50% [WG] P/P

**Envases**

Bolsas de papel en un rango de 100 g a 5 kg Bolsas PET en un rango de 100 g a 5 kg Botes de HDPE en un rango de 100 g a 5 kg. Bolsas de polietileno en un rango de 3 kg a 30 kg.

**Usos y Dosis Autorizados**

| USO                                      | AGENTE   | Dosis   | Condic. Especifico  |
|--|--|---------|---|
| Alcachofa                                | Áfidos, pulgones, Aphididae  | 0,1 %   | Realizar un única aplicación con un volumen de caldo máximo de 300 l/ha, a partir del estado vegetativo de 9 o más hojas desplegadas  |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Áfidos, pulgones, Aphididae  | 0,1 %   | Realizar una única aplicación con un volumen máximo de caldo de 300 l/ha al aire libre y en invernadero, a partir del estado vegetativo de 9 o más hojas desplegadas.   |
| Berenjena                                | Áfidos, pulgones, Aphididae  | 0,1 %   | Realizar una única aplicación a partir del estado vegetativo de 9 o más hojas desplegadas. Al aire libre el volumen de caldo máximo será de 300 l/ha. En invernadero la dosis será de 0,05% con un máximo de 600 l/ha de caldo y un PS de 7 días. |
| Berro, mastuerzo                         | Áfidos, pulgones, Aphididae  | 0,1 %   | Realizar una única aplicación con un volumen de caldo máximo de 240 l/ha, a partir del estado vegetativo de 9 o más hojas desplegadas. Solo para uso al aire libre.   |
| Brécol                                   | Áfidos, pulgones, Aphididae  | 0,1 %   | Realizar una única aplicación con un volumen de caldo máximo de 240 l/ha, a partir del estado vegetativo de 9 o más hojas desplegadas.  |
| Canónigo                                 | Áfidos, pulgones, Aphididae  | 0,1 %   | Realizar una única aplicación con un volumen de caldo máximo de 240 l/ha, a partir del estado vegetativo de 9 o más hojas desplegadas. Solo para uso al aire libre.   |
| Cerezo                                   | Áfidos, pulgones, Aphididae<br>Tigre del almendro, Monosteira unicostata | 0,075 % | Realizar una única aplicación con un máximo de 400 l/ha de volumen de caldo.  |
| Chirivía                                 | Áfidos, pulgones, Aphididae  | 0,1 %   | Realizar un máximo de dos aplicaciones con un intervalo de 7 días, con un volumen de caldo máximo de 270 l/ha, a partir del estado vegetativo de 9 o más hojas desplegadas.   |
| Ciruelo                                  | Áfidos, pulgones, Aphididae  | 0,075 % | Realizar una única aplicación con un máximo de 400 l/ha de volumen de caldo.  |

|   |                             |         |   |
|---|-----------------------------|---------|---|
| Col de Bruselas                         | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,1 %   | Realizar una única aplicación con un volumen de caldo máximo de 240 l/ha, a partir del estado vegetativo de 9 o más hojas desplegadas.  |
| Coliflor                                | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,1 %   | Realizar una única aplicación con un volumen de caldo máximo de 240 l/ha, a partir del estado vegetativo de 9 o más hojas desplegadas.  |
| Colinabo                                | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,1 %   | Realizar una única aplicación con un volumen de caldo máximo de 300 l/ha, a partir del estado vegetativo de 9 o más hojas desplegadas.  |
| Coníferas                               | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,1 %   | Exclusivamente para uso ornamental<br>Realizar una única aplicación con un volumen máximo de caldo de 300 l/ha al aire libre y en invernadero.  |
| Cucurbitáceas de piel comestible        | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,1 %   | Realizar una única aplicación con un volumen de caldo máximo de 300 l/ha, a partir del estado vegetativo de 9 o más hojas desplegadas. El plazo de seguridad en invernadero es de 7 días.   |
| Cucurbitáceas de piel no comestible     | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,1 %   | Realizar una única aplicación con un volumen de caldo máximo de 300 l/ha al aire libre y en invernadero, a partir del estado vegetativo de 9 o más hojas desplegadas.   |
| Escarola                                | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,1 %   | Realizar una única aplicación con un volumen de caldo máximo de 240 l/ha, a partir del estado vegetativo de 9 o más hojas desplegadas. Solo para uso al aire libre.   |
| Espárrago                               | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,1 %   | Realizar una única aplicación tras el periodo de cosecha con un volumen de caldo máximo de 240 l/ha.  |
| Fresal                                  | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,1 %   | Realizar una única aplicación con un volumen de caldo máximo de 300 l/ha al aire libre y en invernadero, a partir del estado vegetativo de 9 o más hojas desplegadas.   |
| Fronosas                                | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,1 %   | Exclusivamente para uso ornamental<br>Realizar una única aplicación con un volumen máximo de caldo de 300 l/ha al aire libre y en invernadero, a partir del estado vegetativo de 9 o más hojas desplegadas.                         |
| Guisante para grano                     | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,1 %   | Realizar un máximo de dos aplicaciones con un intervalo de 7 a 12 días, con un volumen de caldo máximo de 240 l/ha, a partir del estado vegetativo de 9 o más hojas desplegadas.  |
| Guisante verde                          | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,1 %   | Realizar un máximo de dos aplicaciones con un intervalo de 7 a 12 días, con un volumen de caldo máximo de 240 l/ha, a partir del estado vegetativo de 9 o más hojas desplegadas.  |
| Haba para grano                         | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,1 %   | Realizar un máximo de dos aplicaciones con un intervalo de 7 a 12 días, con un volumen de caldo máximo de 240 l/ha, a partir del estado vegetativo de 9 o más hojas desplegadas.  |
| Haba verde                              | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,1 %   | Realizar un máximo de dos aplicaciones con un intervalo de 7 a 12 días, con un volumen de caldo máximo de 240 l/ha, a partir del estado vegetativo de 9 o más hojas desplegadas. Exclusivamente para producción de haba sin vaina.  |
| Hierbas aromáticas y flores comestibles | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,1 %   | Realizar una única aplicación con un volumen de caldo máximo de 240 l/ha, a partir del estado vegetativo de 9 o más hojas desplegadas. Solo para uso al aire libre.   |
| Judía para grano                        | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,1 %   | Realizar un máximo de dos aplicaciones con un intervalo de 7 a 12 días, con un volumen de caldo máximo de 240 l/ha, a partir del estado vegetativo de 9 o más hojas desplegadas.  |
| Judía verde                             | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,1 %   | Realizar un máximo de dos aplicaciones con un intervalo de 7 a 12 días, con un volumen de caldo máximo de 240 l/ha, a partir del estado vegetativo de 9 o más hojas desplegadas. Exclusivamente para producción de judía sin vaina. |
| Lechuga                                 | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,1 %   | Realizar una única aplicación con un volumen de caldo máximo de 240 l/ha, a partir del estado vegetativo de 9 o más hojas desplegadas. Solo para uso al aire libre.   |
| Manzano                                 | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,075 % | Realizar una única aplicación con un máximo de 400 l/ha de volumen de caldo.  |
| Melocotonero                            | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,075 % | Realizar una única aplicación con un máximo de 400 l/ha de volumen de caldo. Se incluye nectarino.  |
| Nabo                                    | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,1 %   | Realizar una única aplicación con un volumen de caldo máximo de 300 l/ha, a partir del estado vegetativo de 9 o más hojas desplegadas.  |
| Ornamentales herbáceas                  | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,1 %   | Realizar una única aplicación con un volumen máximo de caldo de 240 l/ha al aire libre y en invernadero, a partir del estado vegetativo de 9 o más hojas desplegadas.   |
| Palmáceas                               | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,1 %   | Realizar una única aplicación con un volumen máximo de caldo de 300 l/ha al aire libre y en invernadero.  |
| Peral                                   | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,075 % | Realizar una única aplicación con un máximo de 400 l/ha de volumen de caldo.  |
| Pimiento                                | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,1 %   | Realizar una única aplicación con un volumen de caldo máximo de 300 l/ha al aire libre y en invernadero, a partir del estado vegetativo de 9 o más hojas desplegadas.   |
| Rábano                                  | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,1 %   | Realizar un máximo de dos aplicaciones con un intervalo de 7 días, con un volumen de caldo máximo de 270 l/ha, a partir del estado vegetativo de 9 o más hojas desplegadas.   |
| Raíz de perejil                         | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,1 %   | Realizar un máximo de dos aplicaciones con un intervalo de 7 días, con un volumen de caldo máximo de 270 l/ha, a partir del estado vegetativo de 9 o más hojas desplegadas.   |
| Remolacha azucarera                     | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,1 %   | Realizar una única aplicación con un volumen de caldo máximo de 300 l/ha, a partir del estado vegetativo de 9 o más hojas desplegadas.  |
| Remolacha de mesa                       | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,1 %   | Realizar una única aplicación con un volumen de caldo máximo de 300 l/ha, a partir del estado vegetativo de 9 o más hojas desplegadas.  |
| Remolacha forrajera                     | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,1 %   | Realizar una única aplicación con un volumen de caldo máximo de 300 l/ha, a partir del estado vegetativo de 9 o más hojas desplegadas.  |
| Repollo                                 | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,1 %   | Realizar una única aplicación con un volumen de caldo máximo de 240 l/ha, a partir del estado vegetativo de 9 o más hojas desplegadas.  |
| Rúcula                                  | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,1 %   | Realizar una única aplicación con un volumen de caldo máximo de 240 l/ha, a partir del estado vegetativo de 9 o más hojas desplegadas. Solo para uso al aire libre.   |

|                  |                             |       |   |
|------------------|-----------------------------|-------|---|
| <b>Tomate</b>    | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,1 % | Realizar una única aplicación a partir del estado vegetativo de 9 o más hojas desplegadas. Al aire libre el volumen de caldo máximo será de 300 l/ha. En invernadero la dosis será de 0,05% con un máximo de 600 l/ha de caldo y un PS de 7 días. |
| <b>Zanahoria</b> | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,1 % | Realizar un máximo de dos aplicaciones con un intervalo de 7 días, con un volumen de caldo máximo de 270 l/ha, a partir del estado vegetativo de 9 o más hojas desplegadas.   |

**Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)**



| USO   | P.S. (días) |
|---|-------------|
| Berenjena, Chirivía, Col de Bruselas, Cucurbitáceas de piel comestible, Cucurbitáceas de piel no comestible, Haba verde, Judía verde, Pimiento, Rábano, Raíz de perejil, Repollo, Tomate, Zanahoria                                     | 3           |
| Alcachofa, Brécol, Cerezo, Ciruelo, Coliflor, Colinabo, Fresal, Guisante para grano, Guisante verde, Haba para grano, Judía para grano, Manzano, Melocotonero, Nabo, Peral, Remolacha azucarera, Remolacha de mesa, Remolacha forrajera | 7           |
| Berro, mastuerzo, Canónigo, Escarola, Hierbas aromáticas y flores comestibles, Lechuga, Rúcula  | 14          |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales, Coníferas, Espárrago, Frondosas, Ornamentales herbáceas, Palmáceas  | NP          |

**Condiciones Generales de Uso**



Al aire libre: Manzano, peral, melocotonero (incluye nectarino), ciruelo, cerezo, fresa, tomate, berenjena, pimiento, cucurbitáceas de piel comestible y no comestible, zanahoria, raíces de perejil, chirivía, rábano, coles de bruselas, coliflor, colinabo, repollo, lechuga, escarola, canónigos, berro, mastuerzo, rúcula, hierbas aromáticas, alcachofa, espárrago, judía, haba y guisante verde y/o para grano, remolacha, nabo, ornamentales herbáceas, frondosas, coníferas, palmáceas, arbustos y pequeños árboles ornamentales.

En invernadero: Ornamentales herbáceas, coníferas, frondosas, palmáceas, arbustos y pequeños árboles ornamentales, fresa, tomate, berenjena, pimiento, cucurbitáceas de piel comestible y no comestible.

Métodos de aplicación:  
 Al aire libre: Pulverización normal con tractor y manual. En invernadero: Pulverización manual y carretilla.  
 Aplicar en pulverización al inicio de la infestación.

**Clase de Usuario**



Uso profesional en lugares no destinados al público en general.

### Mitigación de riesgos en la manipulación



#### Seguridad del operador:

En todos los cultivos autorizados al aire libre, cuando la pulverización sea normal con tractor, se utilizará ropa de trabajo y guantes de protección química en mezcla-carga como mínima medida de protección individual. Mientras tanto, en aplicación, será necesario el uso de ropa de trabajo. Cuando la pulverización sea manual, tanto en mezcla-carga como en aplicación, se usará ropa de trabajo y guantes de protección química como mínima medida de protección individual.

En invernadero, cuando la aplicación sea mediante pulverización manual, será necesario el uso de ropa de trabajo y guantes de protección química en mezcla-carga, mientras que en aplicación se deberá usar guantes de protección química, ropa de protección química tipo 3 ó 4 de acuerdo a norma UNE-EN 14605:2005+A1:2009, calzado adecuado, capucha y pantalla facial en fresa, tomate, berenjena, pimiento, cucurbitáceas de piel comestible y no comestible, ornamentales herbáceas, frondosas, palmáceas y arbustos y pequeños árboles ornamentales. Cuando la aplicación sea con carretilla, se usarán tanto en mezcla-carga como en aplicación, ropa de trabajo y guantes de protección química en ornamentales herbáceas, frondosas, palmáceas, arbustos y pequeños árboles ornamentales, fresa, tomate, berenjena, pimiento, cucurbitáceas de piel comestible y no comestible.

En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en aplicación o en la mezcla-carga, considerando las más restrictivas en cada caso.

Durante la aplicación con tractor con cabina cerrada y dispositivo de filtrado de aire, se podrá prescindir de los guantes de protección química, siempre que se mantengan las ventanas cerradas.

Se entiende como ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado.

Carretilla de pulverización de productos fitosanitarios, con avance en sentido contrario a la nube de pulverización, provista de dos barras pulverizadoras verticales, cada una de ellas dotada de 4 boquillas de abanico plano con porta-boquillas con función antigoteo. También debe disponer de un manómetro para controlar la presión de trabajo que se recomienda situar entre los 10-15 bares. La distancia entre las barras y el asa debe ser de al menos 1,5 m. Los equipos de pulverización deberán cumplir la legislación que le sea de aplicación en lo relativo a su diseño, comercialización y puesta en servicio, así como encontrarse en correctas condiciones de uso de acuerdo a lo especificado por el fabricante.

#### Seguridad del trabajador:

En todos los cultivos autorizados al aire libre, será necesario el uso de ropa de trabajo y guantes de protección química.

En invernadero, cuando la aplicación sea manual, será necesario el uso de ropa de trabajo en fresa, tomate, berenjena, pimiento, cucurbitáceas de piel comestible y no comestible. En ornamentales herbáceas, frondosas, palmáceas y arbustos y pequeños árboles ornamentales, cuando la aplicación sea manual, será necesario el uso de ropa de trabajo y guantes de protección química.

Cuando la aplicación sea con carretilla, en todos los usos autorizados en invernadero, será necesario el uso de ropa de trabajo y guantes de protección química.

Días de reentrada, para todas las tareas excepto las de inspección y riego:

- 1 día: Ornamentales herbáceas, frondosas, palmáceas y arbustos y pequeños árboles ornamentales (aire libre, pulverización normal con tractor y manual).
- 4 días: Fresa (invernadero, pulverización manual).
- 5 días: Tomate, berenjena, pimiento, cucurbitáceas de piel comestible y no comestible (invernadero, carretilla).
- 6 días: Manzano, peral, melocotonero (incluye nectarino), ciruelo y cerezo (aire libre, tractor).
- 7 días: Ornamentales herbáceas, frondosas, palmáceas y arbustos y pequeños árboles ornamentales (invernadero, carretilla).

Evítese el contacto con el follaje húmedo durante el tratamiento.

En remolacha, caso de tener que colocar, retirar o mover los tubos de riego en las 48 horas posteriores al tratamiento fitosanitario, se utilizarán botas (de caucho o poliméricas), ropa y guantes de protección química adecuados.




No tratar con este producto en caso de que se prevea la realización de labores mecánicas que puedan deteriorar los guantes de protección química.

SPo 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

SPo 5: Ventilar los invernaderos tratados hasta que se haya secado la pulverización antes de volver a entrar.



**Clasificaciones y Etiquetado**

|  |   |
|--|---|
| Clase y categoría de peligro (Humana)          | Carcinogenicidad. Categoría 2.<br>Irritación ocular. Categoría 2.<br>Sensibilización cutánea. Categoría 1.<br>Toxicidad aguda (inhalación). Categoría 4.<br>Toxicidad aguda (oral). Categoría 3   |
| Pictograma                                     |  GHS06 (calavera y tibias cruzadas)<br> GHS08 (peligro para la salud)   |
| Palabra de Advertencia                         | Peligro   |
| Indicaciones de Peligro                        | EUH 401 -A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.<br>H332 -Nocivo en caso de inhalación.<br>H319 -Provoca irritación ocular grave.<br>H317 -Puede provocar una reacción alérgica en la piel.<br>H351 -Se sospecha que provoca cáncer.<br>H301 -Tóxico en caso de ingestión.  |
| Consejos de Prudencia                          | P302+P352 -EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.<br>P305+P351+P338 -EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.<br>P304+P340 -EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.<br>P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol.<br>P405 -Guardar bajo llave.<br>P280 -Llevar guantes, prendas y mascarilla de protección. |
| Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental) | Acuático agudo 1<br>Acuático crónico 1  |
| Pictograma                                     |  GHS09 (medio ambiente)  |
| Palabra de Advertencia                         | Atención  |
| Indicaciones de Peligro                        | H410 -Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.  |
| Consejos de Prudencia                          | P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.<br>P273 -Evitar su liberación al medio ambiente.<br>P391 -Recoger el vertido.  |

**Mitigación de riesgos ambientales**



Spe3: Para proteger a los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad hasta las masas de agua superficial de:  
 -20 m. con cubierta vegetal para los cultivos (aire libre): fresa, tomate, berenjena, pimiento, cucurbitáceas, alcachofa, espárrago, guisantes y judías.  
 -20 m. con 10 m. de cubierta vegetal para manzano, peral, melocotonero (incluye nectarino), ciruelo y cerezo.  
 -10 m. con cubierta vegetal para zanahoria, raíces de perejil, chirivía, rábano, lechuga, escarola, canónigos, berro, mastuerzo, rúcula, hierbas aromáticas y ornamentales (flores).  
 -5 m. para remolacha, nabo y colinabo.  
 Para proteger los artrópodos no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 15 m. hasta la zona no cultivada para manzano, peral, melocotonero (incluye nectarino), ciruelo y cerezo.

Spe8: No utilizar donde haya abejas en pecoreo activo

**Gestión de Envases**



Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.



### Otras Indicaciones reglamentarias

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

El talco no debe contener fibras de asbesto en su composición.

No autorizado para uso profesional en lugares destinados al público en general, en cumplimiento con el artículo 49.4 del Real Decreto 1311/2012 de 14 de septiembre por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de productos fitosanitarios.

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

La frase: "A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO", en caracteres que resalten el texto.